



Sau khi được truyền máu

Chỉ dẫn cho bệnh nhân ngoại chấn

Quý vị có thể tiếp tục các sinh hoạt bình thường của mình trong vòng từ 4 đến 6 tiếng sau khi được truyền máu. Các phản ứng khi được truyền máu có thể xảy ra chậm.

- Nếu bắt đầu bị sốt cùng cảm thấy bị lạnh hoặc không bị lạnh trong vòng 48 tiếng, quý vị có thể đang bị phản ứng chậm khi được truyền máu.
- Nếu thấy nước tiểu có màu đậm, da vàng, hoặc bị mệt bất thường trong vòng 2 tuần kế tiếp, quý vị có thể bị phản ứng chậm khi được truyền máu.

Nếu nghĩ rằng mình bị phản ứng chậm khi được truyền máu, xin gọi nhân viên nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay.

TÊN: _____

SỐ ĐIỆN THOẠI: _____



8/1/03

This information is prepared specifically for patients participating in clinical research at the Warren Grant Magnuson Clinical Center at the National Institutes of Health and is not necessarily applicable to individuals who are patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your healthcare team.

Questions about the Clinical Center? OCCC@cc.nih.gov

Where applicable, brand names of commercial products are provided only as illustrative examples of acceptable products, and do not imply endorsement by NIH; nor does the fact that a particular brand name product is not identified imply that such product is unsatisfactory.

National Institutes of Health
Warren Grant Magnuson Clinical Center
Bethesda, Maryland 20892